

# Fungicida Metalaxil 35%



## SUPERCONTROL

### Presentaciones:

- Botella de 1 litro.
- Botellas de 250 cm<sup>3</sup>.



### Fungicida para tratamiento de semillas

#### **Metalaxil 35%:**

fungicida sistémico con acción preventiva, curativa y erradicante. Perteneciente a la familia de las fenilamidas, actúa inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos.

### Composición

<b>Metalaxil:</b> metil ester de DL-N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2'-metoxiacetil)-alanina	35 gr.
Inertes, coadyuvantes y colorantes c.s.p.	100 cm <sup>3</sup>

### Rasgos diferenciales

- Especialmente indicado para el control de hongos de los géneros *Plasmopara*, *Pythium*, *Phytophthora* y *Peronosclerospora*.
- Aplicación sobre semillas. Producto absorbido por la planta y transportado de manera sistémica otorgando una ventana de protección entre 15 y 60 días, dependiendo de las condiciones climáticas.
- Desarrollados para ser utilizados en combinación con la línea de productos PALAVERSICH.
- Mejor distribución, adherencia y cobertura sobre la semilla.
- Fácil manipulación.

### Instrucciones de uso

Agitar antes de utilizar. Tratar semilla limpia, ventilada, sin restos de polvo, paja etc. con buena energía y poder germinativo. Diluir la dosis en 1 litro de agua y aplicar cada 100 kg. de semilla.

### Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación

Colocar una parte de la semilla en la máquina y agregarle el producto, girar la máquina por unos minutos y luego completar con la semilla restante. El equipo a utilizar debe estar diseñado para tal fin o en su defecto puede utilizarse un tambor rotativo con eje excéntrico con una máquina tipo hormigonera, de manera tal de lograr un buen recubrimiento de las semillas. No aplicar este producto directamente en la sembradora.

## Dosis recomendada para el uso de SUPERCONTROL

Cultivos	Enfermedades	Dosis (cm <sup>3</sup> / 100 Kg. de semilla)
ALGODÓN	Damping off ( <i>Pythium sp.</i> )	100
FLORES Y ORNAMENTALES	Damping off ( <i>Pythium sp.</i> ) Podredumbre de la raíz ( <i>Phytophthora sp.</i> )	25
GIRASOL	Downy Mildew ( <i>Plasmopara halstedii</i> )	600
MAIZ	Damping off ( <i>Pythium sp.</i> ) Downy Mildew ( <i>Plasmopara halstedii</i> )	100 - 300
SOJA	Damping off ( <i>Pythium sp.</i> ) Podredumbre de la raíz ( <i>Phytophthora sp.</i> )	25
TABACO	Moho azul ( <i>Peronospora tabacina</i> )	3 cm <sup>3</sup> /10m <sup>2</sup> de almácigo (*)

(\*) Realizar tratamientos preventivos sobre el suelo del almácigo, antes o después de la siembra. Cuando las plantas tengan 4 a 6 hojas (4 semanas) se puede aplicar cada 15 días en mezclas con Captan 80% en aplicación foliar (3 cm<sup>3</sup> de Palaversich Súper Plus + 9 gr. de Captan 80% cada 10 m<sup>2</sup> de almácigo).