



**FUNGICIDA TERÁPICO
PARA TRATAMIENTO DE SEMILLA**

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Momento de Aplicación
ALGODÓN	Hongos del suelo (<i>Pythium ultimum</i>)	200 cm ³ / 100 kg de semilla + 50 cm ³ de metalaxil-M 35%	Aplicar a las semillas en forma de dilución. Mezclar con metalaxil-M 35%. Se recomienda el agregado de azoxistrobina 25% con condiciones favorables para la infección de Rizhoctonia spp.
	Antracnosis del algodouero (<i>Colletotrichum gossypii</i>) Mancha de la oja (<i>Alternaria tenuis</i>)	PF 2,5% + 1%: 100 cm ³ / 100 kg de semilla + 50 cm ³ de metalaxil-M 35% + 80 cm ³ de azoxistrobina 25 %	
	Hongos del suelo (<i>Rhizoctonia solani</i>) (<i>Fusarium spp.</i>)		
	Hongos del suelo (<i>Pythium ultimum</i>)	PF 2,5% + 1%: 100 cm ³ /100 kg de semilla.	
ARVEJA O ALVERJA	Hongos del suelo (<i>Rhizoctonia solani</i>) (<i>Pythium ultimum</i>)	PF 2,5% + 1%: 100 cm ³ / 100 kg de semilla. PF 2,5 % + 3,75%: 100 cm ³ / 100 kg de semilla.	Aplicar a las semillas en forma de dilución. No requiere periodo de espera entre la aplicación y la siembra.
GIRASOL	Hongos del suelo (<i>Verticillium spp.</i>)(<i>Pythium spp.</i>)(<i>Fusarium spp.</i>)(<i>Aspergillus spp.</i>)(<i>Alternaria spp.</i>)(<i>Rhizoctonia spp.</i>)	PF 2,5% + 1%: 100 cm ³ / 100 kg de semilla.	
MAÍZ	Hongos del suelo (<i>Penicillium spp.</i>)(<i>Pythium spp.</i>)(<i>Fusarium spp.</i>)(<i>Aspergillus spp.</i>)(<i>Rhizoctonia spp.</i>)		
MANÍ	Hongos del suelo (<i>Pythium spp.</i>)	PF 2,5% + 1 %: 100 - 150 cm ³ /100 kg de semilla.	Aplicar a las semillas en forma de dilución. Usar la dosis mayor en siembras tempranas y cuando haya riesgo de ocurrencia de condiciones desfavorables para la rápida emergencia de las plántulas.
	Hongos del suelo (<i>Rhizoctonia spp.</i>)	PF 2,5% + 1%: 100 cm ³ / 100	
	Hongos del suelo (<i>Penicillium spp.</i>)(<i>Fusarium spp.</i>) (<i>Aspergillus spp.</i>)	PF 2,5% + 1 %: 100 - 150 cm ³ / 100 kg de semilla. PF 2,5% + 1%: 100 cm ³ / 100	
POROTO	Hongos del suelo, Damping off (<i>Fusarium spp.</i>)	PF 2,5% + 1%: 100 cm ³ / 100kg de semilla.	Aplicar a las semillas en forma de dilución. No requiere periodo de espera entre la aplicación y la siembra.
	Damping off (<i>Rhizoctonia solani</i>)	PF 2,5% + 1%: 100 cm ³ / 100kg de semilla.	
	Hongos del suelo, Damping off (<i>Pythium spp.</i>)	PF 2,5% + 3,75%: 100 cm ³ / 100 kg de semilla.	
SOJA	Hongos de la semilla (<i>Cladosporium spp.</i>) Hongos del suelo(<i>Rhizoctonia spp.</i>) Hongos del suelo, Damping off (<i>Pythium spp.</i>)(<i>Phytophthora spp.</i>)(<i>Fusarium spp.</i>) (<i>Rhizoctonia solani</i>)(<i>Penicillium spp.</i>) Hongos de suelo, Hongos de semilla. (<i>Aspergillus spp.</i>)(<i>Alternaria spp.</i>)(<i>Cercospora kikuchii</i>)(<i>Phomopsis spp.</i>)(<i>Rhizopus spp.</i>) Mancha ojo de rana(*)(<i>Cercospora sojina</i>) Podredumbre de la raíz y base del tallo(<i>Phytophthora sojina</i>)	PF 2,5% + 1 %: 100 - 200 cm ³ / 100 kg de semilla. PF 2,5% + 3,75%: 100 cm ³ / 100 kg de semilla.	Aplicar a las semillas en forma de dilución. No requiere periodo de espera entre la aplicación y la siembra. Usar la dosis mayor en siembras tempranas y cuando haya riesgo de ocurrencia de condiciones desfavorables para la rápida emergencia de las plántulas.
SORGO	Hongos de suelo (<i>Penicillium spp.</i>)(<i>Pythium spp.</i>)(<i>Fusarium spp.</i>)(<i>Aspergillus spp.</i>)(<i>Alternaria spp.</i>)(<i>Rhizoctonia spp.</i>)(<i>Phoma spp.</i>)(<i>Drechslera spp.</i>)(<i>Nigrospora spp.</i>)	PF 2,5% + 1%: 100 cm ³ /100 kg de semilla.	Aplicar a las semillas en forma de dilución. No requiere periodo de espera entre la aplicación y la siembra.